


Proclarix®

(KSSG)

Labor	Patient	Auftraggeber
	<p>Patientenetikette zwingend hier ▼ aufkleben!</p> <p>Name, Vorname Geburtsdatum Geschlecht Adresse Versicherung</p>	<p>Auftraggeber zwingend hier ▼ erfassen!</p>
	<p>Entnahmedatum:</p>	<p>Tel. Nr. für Rückfragen:</p>
	<p>Entnahmezeit:</p>	
	<p><input type="checkbox"/> Proclarix®</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proclarix® Risk-Score • PSA frei • PSA total • THBS1 (Thrombospondin 1) • CTSD (Cathepsin D) 	<p>Material</p> <p>1 x Vacutainer mit Gel für Serum, 5ml</p> 
	<p>Materialtransport: per Rohrpost</p> <p>Probenstabilität: Raumtemperatur (20-26°C) 8 Stunden Kühlschrank (2-8°C) 5 Tage Tiefgefroren (-15°C bis -30°C) 3 Monate</p>	<p>Informationen zu Proclarix®</p> <p><u>Indikation</u> Der Proclarix® Risk-Score und die damit einhergehenden Analysen sind bei einem PSA-total-Wert zwischen 2-10 µg/l und einem negativen digitalen rektalen Untersuchungsergebnis, das auf ein vergrössertes Prostatavolumen (≥ 35 ml) hinweist, indiziert.</p> <p><u>Präanalytik</u> Bitte führen Sie die Blutentnahme vor der rektalen Untersuchung durch.</p> <p><u>Analytik</u> Die Durchführung erfolgt 1x pro Woche.</p> <p><u>Weitere Informationen</u> kundenservice@zlmmsg.ch</p>